

## ZELFTOETS hiv en andere soa

1. De medicamenteuze behandeling bij een jongeman met uretritisklachten en afscheiding
  - Geef ik meteen ("blind behandelen")
  - Geef ik op basis van de uitslag van het lab onderzoek
  - Anders nl.....
2. Onderzoek naar chlamydia bij een man is even betrouwbaar uit 1<sup>e</sup> straa's urine als via een urethra uitstrijkje
  - Goed
  - Fout
  - Weet niet
3. Een middels PCR vastgestelde gonorrhoe, waarbij een resistentiemeting dus ontbreekt, behandel ik met:
  - Azithromycine 1 gram eenmalig per os
  - Ciprofloxacin 500 mg eenmalig per os
  - Doxycycline 100mg. 2d1 gedurende 1 week per os
  - Ceftriaxon 250 mgr gram IM eenmalig
  - Anders  
namelijk:.....
  - Weet niet uit het hoofd, moet opzoeken
4. Sylvia, 23 jaar, komt op spreekuur en vertelt u dat bij haar partner een chlamydia infectie is vastgesteld. Zelf heeft ze geen klachten.
  - U behandelt haar blind zonder nader onderzoek
  - U doet lichamelijk onderzoek en neemt materiaal uit cervix en urethra af
  - U doet lichamelijk onderzoek en neemt materiaal uit cervix af
  - U laat haar zelf materiaal afnemen (zoals 1<sup>e</sup> straa's urine en/of vaginale wat)
  - Anders:.....
5. Chlamydia komt bij vrouwen van 15-25 jaar vaker voor dan bij vrouwen in de leeftijdscategorie 25-35 jaar.  
Juist.    Onjuist.    Weet niet
6. Een ongecompliceerde chlamydia infectie behandel ik
  - Azitromycine 1 gram eenmalig eenmalig per os.
  - Doxycycline 100 mg. 2dd1 per os.
  - Ofloxacin 2x400mg gedurende 14 dagen per os.
  - Amoxicilline 3x500mg gedurende 7 dagen per os.
  - Anders:.....
  - Weet niet uit het hoofd, moet opzoeken
- 7a. Indien Sylvia klachten heeft van een PID en haar partner heeft een bewezen chlamydia infectie hoe ik geen metronidazol aan de behandeling toe te voegen.  
Juist.    Onjuist.    Weet niet
- 7b. De kans op onvruchtbaarheid na een eenmalige PID-episode bedraagt ongeveer 10-20%.  
Juist.    Onjuist.    Weet niet
- 7c. De kans op onvruchtbaarheid verdubbelt bij een nieuwe PID-episode.  
Juist.    Onjuist.    Weet niet
8. Herpes genitalis wordt in 20% van de gevallen veroorzaakt door HSV type 1
  - Juist.
  - Onjuist.
  - Weet niet.

9. Genitale wratten worden vooral veroorzaakt door HPV typen 16 en 18 die ook geassocieerd zijn met cervixcarcinoom.
- Juist.
  - Onjuist.
  - Weet niet.
10. HSV is 'besmettelijk' van 1 week voor tot 1 week na het uitbreken van erupties.
- Juist.
  - Onjuist.
  - Weet niet.
11. De kans op overdracht van hiv is bij het gelijktijdig bestaan van een andere soa aanzienlijk toegenomen.
- Juist.
  - Onjuist.
  - Weet niet.
12. Bij een onveilig seksueel risico-contact dient een hiv-test
- Meteen te worden gedaan
  - Na 3 maanden te worden gedaan
  - Na 6 maanden te worden gedaan
  - Weet niet
13. Wordt er **in uw praktijk (indien van toepassing)** bij patiënten *met een soa-hulpvraag* aandacht besteed aan het onderwerp veilig vrijen
- (vrijwel) nooit
  - Soms
  - Regelmatig
  - (vrijwel) altijd
14. Wordt er **in uw praktijk (indien van toepassing)** bij patiënten *met een anticonceptie-hulpvraag* (bijvoorbeeld eerste pilconsult) aandacht besteed aan het onderwerp veilig vrijen
- (vrijwel) nooit
  - Soms
  - Regelmatig
  - (vrijwel) altijd
15. Bij partner waarschuwing schakel **ik (indien van toepassing)** de sociaalverpleegkundige van de GGD in voor bron- en contactopsporing
- (vrijwel) nooit.
  - Soms.
  - Regelmatig
  - (vrijwel) altijd.