

Instrumenten voor de preventie van hiv en andere soa

Focus	Instrument	Voorbeeld/Toelichting
Bespelen van de transmissie factoren		
Verlagen transmissie efficiency	Vaccinatie	Hepatitis B vaccinatie campagne risicogroepen.
	Veilig vrijen	Bevorderen vermijden risicovolle handelingen.
	Condoomgebruik	Bevorderen consequent en correct condoomgebruik.
	PEP	Binnen 72 uur na risico op hiv transmissie toedienen van hiv-remmers ter voorkoming transmissie.
	PrEP	In onderzoek: slikken van hiv-remmer voorafgaande aan transmissie risico.
Verlagen aantal onbeschermd contacten tussen geïnfecteerden en ongeïnfecteerden.	Contact en bronopsporing	
	Partnerwaarschuwing	Partnerwaarschuwing door de indexpatiënt of door de hulpverlener bevorderen.
	Netwerkwaarschuwing	Specifieke seksnetwerken waarschuwen voor verheffing specifieke soa.
Verlagen duur van infectie	Screening	Screening zwangeren op hiv en syfilis. Proefimplementatie chlamydia screening jongeren.
	Actief testen	Promotie halfjaarlijks test op hiv/soa onder MSM. Opting out hiv-test bezoekers GGD soa polikliniek.
	Behandeling	Door hiv-behandeling verlagen van de viral load en daarmee het risico op verdere transmissie.
Inzetten op alle ingangen voor preventie		
	Omgeving	Vignet Veiliger Sekslocatie: inrichting sekslocaties voor MSM. Holy Sex: discussie met religieuze leiders van etnische gemeenschappen.
	Wet- en regelgeving	Eisen over hygiëne en veilig vrijen in bordelen opnemen in lokale verordening en vergunningen. Handhaving door controle.
	Bewustwording en educatie	Vrijsoavrij en Maak seks lekker duidelijk campagnes. Seksuele en relationele vorming in het onderwijs. Out reach voorlichting op locatie.
	Signalering en advisering	Spreekuren op GD soa poliklinieken. Sense spreekuren voor jongeren
	Ondersteuning	Motiverende gesprekstechniek counseling op GGD soa polikliniek. Gespreksgroepen voor mensen met hiv over omgaan met (on)veilig vrijen.
	Zorggerelateerde preventie	Ondersteuning seksuele gezondheid van mensen met hiv in de hiv-behandelcentra.